



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 31 du 26 septembre 2006 - 1 page

Colza

STADES : 4 à 8 feuilles pour la majorité des parcelles,
1 à 4 feuilles pour ceux de début septembre.

Ravageurs

Après le pic de de la semaine dernière, les captures de **tenthredes** en cuvette sont en forte régression sur l'ensemble de la région. Sur plantes, les chenilles de tenthredes restent présentes sur 10-15% des pieds au plus. On note aussi, simultanément ou non, la présence d'autres chenilles défoliatrices : **teignes** des crucifères (chenilles à tête foncée), noctuelles..

Les captures de **grosses altises** sont en nette augmentation dans deux secteurs :

- Fontaine le port et Chaumes en Brie (77),
- Bullion (78), Limours et Gometz la ville (91)

Deux captures isolées de **charançon du bourgeon terminal** ont été relevées sur l'ensemble du réseau.

Pour les **pucerons verts**, les infestations restent faibles (moins de 10-15% de pieds porteurs).

Pas d'intervention insecticide nécessaire en l'état actuel de la situation.

Le suivi en cultures maraichères réalisé par la FREDON indique des dépôts de ponte de mouche du chou depuis 15 jours dans le chou. Fin octobre, nous ferons un relevé des attaques sur les colzas cet automne.

Maladies

Apparition des premières macules de phoma. Absence d'oïdium.

Maïs

Chrysomèle

Toujours pas de chrysomèle détectée dans la région ni en picardie.

Les obligations en matière de rotation restent valables pour la prochaine campagne, nous y reviendrons prochainement. Dans le Val d'Oise, l'Essonne, les Yvelines, et dans les communes de Seine et Marne appartenant à la zone focus ou tampon, **il reste interdit de faire du maïs deux années successives sur la même parcelle.**

Pyrale

Le vol de deuxième génération a été assez conséquent. Dans nos sondages larvaires, on constate :


- la présence habituelle de larves de la première génération (au dernier stade larvaire, taille > 20mm), de nymphes ou d'enveloppes nymphales, dans des galeries en bas de la tige,
- de larves de la seconde génération (2ème ou 3ème stade larvaire, taille de 4 à 12 mm), présentes dans les épis en zones précoces (secteurs Château Landon-Montereau - Bray sur Seine). Présence également signalée sur maïs doux au Plessis Gassot (95).

Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter pour nous indiquer une parcelle qui n'aurait pas reçu de traitement.

Des pucerons sont parfois présents dans les épis.

Captures moyennes de pyrale

réseau SPV - FREDON



La semaine prochaine, un point complet sur le nouvel arrêté relatif aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires.



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Alertes Agricoles de Rungis
Directeur gérant : B. FERREIRA

Publication périodique C.P.A.P.
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2006:
77 euros (papier)
72 euros (fax)
66 euros (mail)

03 50 50 48745

BnF
S&T

796